新生児の外性器異常をみたら

あいち小児保健医療総合センター
内分泌代謝科 井澤雅子

日本小児内分泌学会 COI 開示

筆頭発表者名： 井澤 雅子

日本小児内分泌学会の定める利益相反に関する
開示事項はありません

ある分娩室にて

Ns.「泣き声もしっかりしていて元気な赤ちゃんが産まれましたよ！」

Mo.「よかった～！！先生、男の子ですか？女の子ですか？」

Dr.「んっ？？う～ん、たぶん・・・男の子だと思うんだけど、どっちだろう？わからないな～、どうしよう・・・」

こんな時、どのように対応すればよいのでしょうか？

はじめに

新生児期に気づかれる外性器異常は、社会的性の決定に関わる大きな問題であり、家族にとっては心理的に大きな負担となる。そのため、迅速かつ正確な医学的評価と家族の心理的サポートを要する社会的緊急状態と考えられ、その取扱いについて経験の豊富な施設で対応すべき疾患である。

* 性分化疾患 (Disorder of Sex Development; DSD)

= 性腺、外性器および内性器の分化が非典型的である先天的状態

* 非典型的で性別判定困難な外性器 = あいまいな外性器
ambiguous genitalia

参考)

性分化疾患初期対応の手引き(平成23年1月 日本小児内分泌学会性分化委員会)

本日の内容

1. 症例提示(2例)
2. 性分化の基本的事項
診察から家族への対応まで
3. 症例の解説

* 提示症例は都立清瀬小児病院(現 都立小児総合医療センター)で経験した症例です

症例 1

日齡2

妊娠分娩歴：在胎40W2day、3214gで出生、仮死なし
家族歴：血族婚なし、3歳の姉は健康

全身状態、活気、哺乳力は良好

あいまいな外性器と皮膚色素沈着を認めた

症例 2

日齡0

妊娠分娩歴：在胎39W6day、2962gで出生、仮死なし

家族歴：血族婚なし、第1子

全身状態、活気、哺乳力は良好

あいまいな外性器以外に異常所見は認めない

初期対応、どうする？

御家族への声かけ

- ・おめでとうございます。元気なかわいい赤ちゃんです！
- ・外性器の成熟が遅れているので、診察のみで性別を判断することが困難です。性別をきちんと判断するために検査をする必要があります。

注意！避けたい表現

「男の子か女の子かわからない」「不完全」「異常」
安易に不確かな性別を告げないこと！

戸籍法第49条

「出生の届出は**14日以内**に提出しなければならない」
性別、名前は未載で提出し追完できるが、「追完」の記録が残る。
正当な理由があれば届出期限延長はできる。
提出後に性別変更する際には、家庭裁判所での審議が必要であり、手続きに時間がかかる(数ヵ月)。「変更」の記録が残る。

14日以内に、社会的性別を決定できることが望ましい。
詳細な診断はできなくても、社会的性別選択の判断材料をそろえることはできる。

→ 経験豊富な専門施設に紹介、相談することが重要！！
(経験豊富な専門施設は小児内分泌学会HPに公開準備中！)

性分化の過程

AMH: 抗ミュラー管ホルモン

4つの性

染色体

性腺

内性器

外性器

(+脳の性)

内性器の分化

外性器の分化

図: Williams textbook of Endocrinologyより

外陰部の診察：男児の男性化不全

1. 性腺を触知できるか？

鼠径部～外陰部に触知できる場合は精巣の可能性が高い

2. 陰茎長は？ 測定法に注意！

陰茎：恥骨から伸展して計測 <24 mm → 小陰茎

3. 尿道口的位置は？

会陰部に近いほど男性化不全の程度が強い

4. 陰囊の形成は？

低形成、二分陰囊の有無

<Quigley分類>

完全男性型

完全女性型

外陰部の診察：女児の男性化

1. 陰核の大きさは？

横径を計測することが多い。 $>7\text{ mm}$ → 陰核肥大

2. 膣口は確認できるか？

<anogenital ratio>

3. 陰唇癒合はあるか？

anogenital ratio = AF/AC

乳児 0.37 ± 0.07 (平均 $\pm$ SD)

>0.5 → アンドロゲン過剰を疑う

AF: 肛門—陰唇小帯間
AC: 肛門—陰核基部間

<Prader分類>

完全女性型

I度

II度

III度

IV度

V度

完全男性型

図: たのしく学ぶ小児内分泌より

その他の所見

1. 外陰部に左右差はないか？

混合性性腺異形成症(MGD)、卵精巢性DSD、46,XX/46,XYなど

2. 色素沈着はないか？

特に口唇、乳輪、腋窩、外陰部に目立ちやすい

→ 副腎皮質過形成症

3. 骨格の異常はないか？

頭蓋骨早期癒合、上腕骨橈骨癒合、多発性関節拘縮など
(Antley-Bixler症候群) → p450オキシドリラクターゼ欠損症

四肢彎曲、短縮など(campomelic dysplasia)

→ SOX9遺伝子異常症

必要な検査

1、性染色体の確認

Y染色体の有無を確認 → SRY遺伝子/Y染色体 FISH
G-banding

2、内分泌学的検査

電解質、血糖、一般尿検査

LH、FSH、テストステロン、エストラジオール、AMH

ACTH、コルチゾール、17OHP、レニン活性、アルドステロン

尿中ステロイドプロフィール

3、超音波、MRI

性腺、子宮、膣の評価

4、経尿道・膣内視鏡、尿道・膣造影

子宮の有無、膣の大きさの評価

共通泌尿生殖洞の評価(膣開口の位置)

性別の判断

1. 心理・社会的緊急性がある

性別判断の遅れ、誤りは家族、本人にとって重大な問題

→ 迅速かつ適確な評価と対応が必要

2. 専門診療、チーム医療の必要性

小児泌尿器科、小児内分泌科、小児外科、児童精神科、
看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカーなどによるチーム

→ 新生児期から共同認識のもとで関与し、長期にわたり患者、家族をサポートする体制が必要

3. 性別判定因子

① 男性化不全の程度：**陰茎長**が目安となる

将来、立位での排尿が可能か、性生活が可能か

新生児期で > 20 mmが目安

男性ホルモン治療に反応する可能性も考慮

② **子宮、膣の存在**

子宮 → 月経発来的前提

膣 → 将来の性生活が可能か

③ **妊孕性**、思春期以降の性ホルモン産生の可能性

ambiguous genitaliaの程度が強くても、妊孕性が期待できる

性を選択することが原則

④ **脳の男性化**：胎児期の男性ホルモン曝露

⑤ **形成手術の難易度**

難易度の高い形成は複数回の手術を要することがある

2歳以降の外陰部手術はできるだけ避けたい

家族への対応

1. 性別判断の材料がすべてそろってから、チーム内で総合的な解釈を検討後に説明する。チーム内での見解、方針、使う言葉を統一する。
2. 虚偽を述べず、可能な限りの情報を提示、共有したうえで性別の提言を行う。可能な限り両親の考え方、希望を尊重する。
3. 「わからない」「不完全」「異常」といった表現や、十分な説明のない状態で「どちらにしますか」「どちらでもよい」といった表現は避ける。
4. 両親の子供に対する接し方を迷わせない。決定した社会的性での養育をサポートする。反対の性の用語を用いない。
5. 将来、問題が生じた際に相談しやすい体制、関係を築く。

症例の解説: 症例1

4つの性

染色体 → 46,XX

性腺 → 卵巣

内性器 → 子宮、膣

外性器 → 陰核肥大(15 mm)
陰唇癒合あり
膣口確認できず

→ 会陰部より7 mmに
膣開口を確認

III度

Prader分類

Na	136	mEq/l	ACTH	702	pg/ml
K	6.3	mEq/l	17OHP	40.1	ng/ml
Cl	102	mEq/l	テストステロン	8.01	ng/ml
BS	77	mg/dl	レニン活性	>18.0	ng/ml/h

診断: 21水酸化酵素欠損症

性別: 女児

症例の解説: 症例2

mos 46,XY/45,X

右: 精巣
左: 索状性腺、卵管様構造あり

子宮、膣

陰核肥大(18 mm)
陰唇癒合あり
膣口確認できず

→ 会陰部より4 mmに膣開口を確認

外陰部の左右差がめだってきた

右には腫瘤を触知

LH 3.24 mIU/ml テストステロン 1.13 ng/ml

FSH 2.37 mIU/ml

診断: 混合性性腺異形成症

性別: 女兒を選択

まとめ

- * 新生児外性器異常を有する症例では、社会的性別（養育性）を迅速かつ適切に判断する必要があり、性別判断の遅れ、誤りは本人、家族にとって重大な問題となりうる。
- * 性別決定時のみならず、その後の診療においても各科専門医、コメディカルを含めたチームで長期にわたりフォローする体制をとることが望ましい。性分化疾患は経験豊富な専門施設で扱われるべきである。

新生児の外性器異常をみたら・・・

選択肢①

「とても元気な赤ちゃんです。
外性器の成熟が遅れていて、すぐに性別を判断することが
できません。専門病院で検査をしてもらいましょう。」

選択肢②

我々と一緒に小児内分泌の勉強をしてみませんか？

謝辞

都立小児総合医療センター(都立清瀬小児病院)

長谷川行洋先生

一緒に診療に携わった多くの先生、スタッフの皆様

あいち小児保健医療総合センター

濱島 崇先生

内分泌代謝科レジデント:

西門優一先生、西村尚子先生

DSDチームの皆様

多くの患者様、御家族の皆様